

ระวัง! ไข้เลือดออก

อันตรายถึงชีวิต!

- อาการควรรีบพบแพทย์**
- ไข้สูงเฉียบพลัน
 - ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
 - ปวดกระบอกตา
 - มีจุดเลือดออกตามตัว
 - อาเจียน ปวดท้อง
 - อ่อนเพลีย ซึมลง

ไข้สูง
ปวดหัว
ปวดตัว...

ยุงลาย
พาหะนำโรค
ไข้เลือดออก



อย่าชะล่าใจ!
หากมีอาการรีบไป
โรงพยาบาลทันที

อันตราย!
อาจเสียชีวิต
ได้เลยนะ!

ยุงลาย
กัด
ในเวลากลางวัน

ป้องกันได้! ไม่ให้ยุงลายเกิด

เก็บบ้านให้สะอาด
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บน้ำให้มิดชิด
ปิดฝาภาชนะให้สนิท

เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน
ในแจกัน จานรองกระถาง

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
เทน้ำขัง คว่ำภาชนะ

ป้องกันยุงกัด
ทายากันยุง นอนในมุ้ง

ร่วมมือ ร่วมใจ กำจัดยุงลาย หยุดภัยไข้เลือดออก